

I'M IN



Dispuesto a que cada día cuente

IRRESECCABLE

CARCINOMA
HEPATOCELULAR

IMFINZI combinado con una dosis de IMJUDO* es un tratamiento de inmunoterapia aprobado para adultos con carcinoma hepatocelular irreseccable (CHCi).

*IMFINZI se administra con una dosis de IMJUDO el primer día, seguida de infusiones de IMFINZI en monoterapia cada 4 semanas. IMFINZI e IMJUDO no son medicamentos de quimioterapia.

¿QUÉ SON IMFINZI E IMJUDO?

IMFINZI es un medicamento con receta que se utiliza en combinación con IMJUDO para tratar a adultos con **un tipo de cáncer de hígado que no se puede extirpar mediante cirugía (carcinoma hepatocelular irreseccable o CHCi).**

Se desconoce si IMFINZI e IMJUDO son seguros y eficaces en niños.

IMFINZI®
durvalumab
Injection for Intravenous Use 50 mg/mL

IMJUDO®
tremelimumab-actl
Injection for Intravenous Use 20 mg/mL

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

¿Cuál es la principal información que debo conocer sobre IMFINZI® (durvalumab) e IMJUDO® (tremelimumab-actl)?

IMFINZI e IMJUDO son medicamentos que pueden tratar ciertos tipos de cáncer actuando con su sistema inmunitario. Sin embargo, IMFINZI e IMJUDO pueden provocar que su sistema inmunitario ataque órganos y tejidos sanos, afectando a su funcionamiento. Las consecuencias pueden llegar a ser graves o potencialmente mortales y pueden provocar la muerte. Puede sufrir varios de estos trastornos al mismo tiempo y en cualquier momento del tratamiento; incluso después de que este haya finalizado.

Para obtener Información Importante de Seguridad adicional, consulte las páginas 16 a 19.



COMIENZO DEL TRATAMIENTO CON IMFINZI + IMJUDO

Un diagnóstico de cáncer de hígado puede llegar de repente y resultar difícil de procesar. Es posible que experimente una variedad de emociones y que sienta inseguridad sobre lo que viene a continuación. Esta guía puede ayudarle. Utilícela para obtener más información sobre el cáncer, el tratamiento con IMFINZI + IMJUDO y el apoyo disponible a medida que avanza en este proceso.

Más información sobre el carcinoma hepatocelular irreseccable

¿Qué son IMFINZI + IMJUDO?

¿Cómo se han estudiado IMFINZI + IMJUDO?

Resultados de IMFINZI + IMJUDO

¿Cómo funcionan juntos IMFINZI + IMJUDO?

¿Cómo se administran IMFINZI + IMJUDO?

¿Cómo me preparo para el tratamiento?

Recursos y apoyo

Información de seguridad seleccionada

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA (continuación)

Llame o acuda a su proveedor de atención médica de inmediato si experimenta cualquier signo o síntoma nuevo o que empeore, incluidos:

Trastornos pulmonares: tos, falta de aire y dolor de pecho

Para obtener Información Importante de Seguridad adicional consulte las páginas 16 a 19.



4

6

7

8

10

12

13

14

16


MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CARCINOMA HEPATOCELULAR IRRESECABLE

El carcinoma hepatocelular (CHC) es un tipo de cáncer de hígado. Debido a que los síntomas a menudo no aparecen hasta las etapas avanzadas, muchas personas no reciben el diagnóstico de CHC hasta que el cáncer se ha diseminado más allá del hígado, lo que puede provocar un shock. Aunque es natural que se sienta abrumado, es importante que sepa que no está solo.



Se estima que **41.000 personas en los EE. UU. fueron diagnosticadas con cáncer de hígado en 2022**

Hay más de un tipo de cáncer de hígado, pero entre el 75 % y el 80 % de estos cánceres son CHC, lo que lo convierte en el tipo de cáncer de hígado más frecuente en adultos. Y más de la mitad de todas las personas con CHC son diagnosticadas en una etapa avanzada.



CÓMO EL CHC AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL HÍGADO

El hígado realiza muchas funciones importantes. Un hígado saludable:

- descompone los nutrientes que el cuerpo necesita
- ayuda al cuerpo a eliminar toxinas
- favorece un flujo sanguíneo saludable

El CHC puede impedir que el hígado realice estas funciones vitales y llegar a causar una insuficiencia hepática.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO DEL CHC?

El CHC es más frecuente en hombres que en mujeres. Algunos otros factores de riesgo conocidos importantes para el CHC incluyen:



- infección por el virus de la hepatitis B
- infección por el virus de la hepatitis C
- diabetes tipo 2 (DT2)
- consumo excesivo de alcohol
- esteatohepatitis asociada con disfunción metabólica (MASH)
- obesidad
- tabaquismo



¿Qué es un tumor irresecable?

Un tumor irresecable no se puede extirpar con cirugía. Esto se debe a que el tumor es demasiado grande o está demasiado cerca de un vaso sanguíneo grande, o porque el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo.



Independientemente de cómo se iniciara su afección, hay motivos para la esperanza, ya que los médicos están estudiando nuevas formas de comprender y tratar el CHC.

¿QUÉ SON IMFINZI + IMJUDO?

IMFINZI + IMJUDO ES UNA INMUNOTERAPIA COMBINADA

IMFINZI e IMJUDO juntos son un tratamiento contra el cáncer que actúa con el sistema inmunitario de su organismo para ayudar a combatirlo. La combinación de estas dos inmunoterapias, IMFINZI + IMJUDO, es un régimen de tratamiento para adultos con CHCi. Este tratamiento también puede hacer que el sistema inmunitario ataque células sanas.



Para obtener Información Importante de Seguridad adicional consulte las páginas 16 a 19.

¿CÓMO SE HAN ESTUDIADO IMFINZI + IMJUDO?

LA PRIMERA Y ÚNICA

INMUNOTERAPIA COMBINADA

CON RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A 5 AÑOS EN CHCI

En un estudio clínico se compararon dos grupos de personas con CHCi cuyo cáncer no había sido tratado previamente. El objetivo principal de este estudio era medir la supervivencia general, que es la cantidad de tiempo que los pacientes vivían después del inicio del tratamiento.

Se realizó un análisis de seguimiento (denominado análisis post-hoc) con un grupo de personas de este estudio clínico original. Se midió la supervivencia general a los 5 años. Basado en las limitaciones del análisis, los resultados del análisis de seguimiento son descriptivos. Este análisis se realizó aproximadamente 5 años después de que el último paciente comenzara el tratamiento en este estudio.

393 

PERSONAS recibieron
IMFINZI + IMJUDO

versus

389 

PERSONAS recibieron
sorafenib

El objetivo principal de este estudio fue medir la supervivencia general. Entre los pacientes del estudio se encontraban aquellos que podían presentar la enfermedad fuera del hígado o que tenían una enfermedad hepática en etapa avanzada.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA (CONTINUACIÓN)

Llame o acuda a su proveedor de atención médica de inmediato si experimenta cualquier signo o síntoma nuevo o que empeore, incluidos:

Trastornos intestinales: diarrea (heces blandas) o deposiciones más frecuentes de lo habitual; heces negras, alquitranadas, pegajosas o con sangre o mucosidad; y dolor o sensibilidad intensos en la zona del estómago (abdomen)

Trastornos hepáticos: coloración amarillenta de la piel o del blanco de los ojos, náuseas o vómitos intensos, dolor en el lado derecho del estómago (abdomen), orina oscura (de color té) y hemorragia o hematomas que ocurren con más facilidad de lo normal

 **IMFINZI®**
durvalumab
Injection for Intravenous Use 50 mg/mL

 **IMJUDO®**
tremelimumab-actl
Injection for Intravenous Use 20 mg/mL

RESULTADOS DE IMFINZI + IMJUDO

IMFINZI + IMJUDO PROPORCIONA A LOS PACIENTES LA ESPERANZA DE PODER VIVIR MÁS TIEMPO CON CHCi

Mediana de supervivencia general:



IMFINZI + IMJUDO redujo el riesgo de muerte en un 22 % en comparación con sorafenib.

En el estudio se midió la mediana de la supervivencia general, que es el periodo transcurrido desde el inicio del tratamiento hasta el momento en que la mitad de los pacientes siguen viviendo. La mitad de las personas que recibieron IMFINZI + IMJUDO seguían con vida a los 16 meses, en comparación con 14 meses para las personas tratadas con sorafenib.

Fecha de corte de los datos: 27 de agosto de 2021.


EN UN ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO A LOS 5 AÑOS:



En función de las limitaciones del análisis de seguimiento, los resultados son descriptivos y su experiencia puede ser diferente. Este análisis se realizó aproximadamente 5 años después de que el último paciente comenzara el tratamiento en este estudio.

Fecha de corte de los datos: 1 de marzo de 2024.

SE REDUJERON LOS TUMORES DEL 20% DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON IMFINZI + IMJUDO



El estudio incluyó a 393 personas que tomaban IMFINZI + IMJUDO y a 389 personas que tomaban sorafenib. Los tumores se redujeron en 79 de las personas que tomaron IMFINZI + IMJUDO y 20 de las que tomaron sorafenib.

Según los límites del análisis, los resultados son solo descriptivos y su experiencia puede diferir.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA (continuación)

Llame o acuda a su proveedor de atención médica de inmediato si experimenta cualquier signo o síntoma nuevo o que empeore, incluidos:

Problemas de las glándulas hormonales: dolores de cabeza que no desaparecen o dolores de cabeza inusuales; sensibilidad ocular a la luz; problemas oculares; latidos cardíacos rápidos; mayor sudoración; cansancio extremo; aumento o pérdida de peso; tener más hambre o sed de lo habitual; orinar con más frecuencia de lo habitual; caída del cabello; sensación de frío; estreñimiento; su voz se vuelve más grave; mareos o desmayos; y cambios en el estado de ánimo o el comportamiento, como disminución del deseo sexual, irritabilidad u olvidos

Para obtener Información Importante de Seguridad adicional consulte las páginas 16 a 19.



¿CÓMO FUNCIONAN JUNTOS IMFINZI + IMJUDO?

CONOZCA A LOS PROTAGONISTAS



CÉLULA SANA



SISTEMA INMUNITARIO



CÉLULA CANCEROSA




IMFINZI



IMJUDO


CÓMO COMBATEN EL CHC LAS INMUNOTERAPIAS IMFINZI + IMJUDO

IMFINZI + IMJUDO son inmunoterapias que actúan con el sistema inmunitario de su organismo para ayudar a combatir el cáncer, pero que también pueden afectar a las células sanas.




1

El sistema inmunitario sirve como defensa natural del organismo contra infecciones y enfermedades, identificando y atacando a las células cancerosas cuando estas aparecen.




2

Las células cancerosas utilizan las proteínas CTLA-4 y PD-L1 para eludir al sistema inmunitario: CTLA-4 impide el ataque de las células inmunitarias y PD-L1 oculta las células cancerosas para que el sistema inmunitario no las detecte.



3

IMFINZI ayuda a detectar las células cancerosas ocultas por la PD-L1 e IMJUDO reactiva el ataque de las células inmunitarias



4

Así, su sistema inmunitario puede cumplir con su objetivo: combatir las células cancerosas. Sin embargo, IMFINZI + IMJUDO también pueden afectar a las células sanas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA (continuación)


Llame o acuda a su proveedor de atención médica de inmediato si experimenta cualquier signo o síntoma nuevo o que empeore, incluidos:

Trastornos renales: disminución de la cantidad de orina, sangre en la orina, hinchazón de los tobillos y pérdida del apetito

¿CÓMO SE ADMINISTTRAN IMFINZI + IMJUDO?

IMFINZI E IMJUDO SON INFUSIONES INTRAVENOSAS (IV)

Recibirá IMFINZI e IMJUDO en la consulta de su médico o en un centro de infusión. En la primera infusión, se le administrará IMFINZI con una sola dosis de IMJUDO, seguida de infusiones de IMFINZI en monoterapia cada 4 semanas.



¿CUÁNTO DURAN LAS INFUSIONES?

Las infusiones de IMFINZI e IMJUDO suelen durar **aproximadamente una hora**, seguidas de un periodo de observación de 60 minutos después de IMJUDO. El médico también le realizará análisis de sangre para controlar la aparición de determinados efectos secundarios.



¿CUÁNTAS INFUSIONES RECIBIRÉ?

Su médico determinará el número de tratamientos. Llevará a cabo controles regulares para detectar posibles efectos secundarios y comprobar si IMFINZI consigue impedir que su cáncer crezca o se disemine. Es posible que su proveedor de atención médica deba retrasar o interrumpir por completo el tratamiento con IMFINZI si usted presenta efectos secundarios graves.



Informe a su proveedor de atención médica si presenta efectos secundarios o sufre alguna reacción a la infusión. Para obtener una lista de los efectos secundarios, consulte la Información Importante de Seguridad en las páginas 16 a 19.

¿CÓMO ME PREPARO PARA EL TRATAMIENTO?



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA (continuación)

Llame o acuda a su proveedor de atención médica de inmediato si experimenta cualquier signo o síntoma nuevo o que empeore, incluidos:

Trastornos de la piel: sarpullido; comezón; ampollas o descamación de la piel; llagas o úlceras dolorosas en la boca o nariz, garganta o zona genital; fiebre o síntomas parecidos a los de la gripe; y ganglios linfáticos inflamados

Puede que IMFINZI + IMJUDO no funcionen para todas las personas. Se desconoce si IMFINZI + IMJUDO son seguros y eficaces en niños.

Durante el tratamiento, la prioridad es que se sienta cómodo, y basta algo de planificación para mejorar en gran medida su experiencia. He aquí algunas sugerencias que le ayudarán a prepararse para los días de infusión:



Beba mucha agua e hidrátese



Recuerde traer la tarjeta del seguro



Vístase cómodamente con ropa holgada



Haga una lista de los medicamentos que está tomando actualmente



Anote cualquier pregunta que tenga para el equipo de atención



Manténgase ocupado durante el tratamiento con libros, crucigramas y dispositivos móviles

Para obtener Información Importante de Seguridad adicional consulte las páginas 16 a 19.



RECURSOS Y APOYO

Vivir con un carcinoma hepatocelular tiene sus desafíos.

Sin embargo, hay muchos lugares donde encontrará ayuda para su proceso. Los siguientes recursos le proporcionarán:

- Información adicional sobre el cáncer
- Más consejos útiles para vivir con cáncer
- Apoyo emocional en contacto con otros pacientes

APOYO PARA LAS PERSONAS CON CÁNCER DE HÍGADO



Blue Faery, The Adrienne Wilson Asociación de Cáncer de Hígado

La misión de Blue Faery es prevenir, tratar y curar el cáncer de hígado primario, especialmente el carcinoma hepatocelular, a través de la investigación, la educación y la concienciación. Con una variedad de herramientas y recursos, Blue Faery tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con CHC y sus cuidadores. Visite **BlueFaery.org** (disponible solo en inglés).

ASISTENCIA DE TRANSPORTE



Air Charity Network

Proporciona transporte aéreo gratuito a centros médicos para pacientes con dificultades económicas o que no pueden viajar en transporte público. Visite **aircharitynetwork.org** (disponible solo en inglés).

American Cancer Society Road To Recovery®

Coordina los desplazamientos de ida y vuelta de los pacientes hasta el lugar de tratamiento con un conductor voluntario de la American Cancer Society o con un socio de transporte local. Visite **cancer.org/support-programs-and-services/road-to-recovery** (disponible solo en inglés).

ACCEDA A LA ATENCIÓN QUE NECESITA



El programa **AstraZeneca Access 360™** puede ayudarle a iniciar el tratamiento con IMFINZI.

Para obtener más información, llame al **1-844-ASK-A360 (1-844-275-2360)**, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m. hora del Este, o visite **MyAccess360.com** (disponible solo en inglés).

El programa de ahorro para pacientes de **IMFINZI** está disponible para ayudar con los gastos de bolsillo derivados del tratamiento a aquellos asegurados que reúnan los requisitos. Para obtener más información, visite **azpatientsupport.com** (disponible solo en inglés).



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL INFORMACIÓN QUE DEBO CONOCER SOBRE IMFINZI® (DURVALUMAB) E IMJUDO® (TREMELIMUMAB-ACTL)?

IMFINZI e IMJUDO son medicamentos que pueden tratar ciertos tipos de cáncer actuando con su sistema inmunitario. Sin embargo, IMFINZI e IMJUDO pueden provocar que su sistema inmunitario ataque órganos y tejidos sanos, afectando a su funcionamiento. Las consecuencias pueden llegar a ser graves o potencialmente mortales y pueden provocar la muerte. Puede sufrir varios de estos trastornos al mismo tiempo y en cualquier momento del tratamiento; incluso después de que este haya finalizado.

Llame o acuda a su proveedor de atención médica de inmediato si experimenta cualquier signo o síntoma nuevo o que empeore, incluidos:

- 

Trastornos pulmonares: tos, falta de aire y dolor de pecho
- 

Trastornos intestinales: diarrea (heces blandas) o deposiciones más frecuentes de lo habitual; heces negras, alquitranadas, pegajosas o con sangre o mucosidad; y dolor o sensibilidad intensos en la zona del estómago (abdomen)
- 

Trastornos hepáticos: coloración amarillenta de la piel o del blanco de los ojos, náuseas o vómitos intensos, dolor en el lado derecho del estómago (abdomen), orina oscura (de color té) y hemorragia o hematomas que ocurren con más facilidad de lo normal
- 

Problemas de las glándulas hormonales: dolores de cabeza que no desaparecen o dolores de cabeza inusuales; sensibilidad ocular a la luz; problemas oculares; latidos cardíacos rápidos; mayor sudoración; cansancio extremo; aumento o pérdida de peso; tener más hambre o sed de lo habitual; orinar con más frecuencia de lo habitual; caída del cabello; sensación de frío; estreñimiento; su voz se vuelve más grave; mareos o desmayos; y cambios en el estado de ánimo o el comportamiento, como disminución del deseo sexual, irritabilidad u olvidos
- 

Trastornos renales: disminución de la cantidad de orina, sangre en la orina, hinchazón de los tobillos y pérdida del apetito



Trastornos de la piel: sarpullido; comezón; ampollas o descamación de la piel; llagas o úlceras dolorosas en la boca o nariz, garganta o zona genital; fiebre o síntomas parecidos a los de la gripe; y ganglios linfáticos inflamados



Trastornos del páncreas: dolor en la parte superior del estómago (abdomen), náuseas o vómitos intensos y pérdida del apetito



Los trastornos también pueden presentarse en otros órganos y tejidos. No se incluyen todos los signos y síntomas de trastornos del sistema inmunitario que pueden producirse con IMFINZI e IMJUDO. Llame o consulte a su proveedor de atención médica de inmediato ante cualquier signo o síntoma nuevo o que empeore, lo que puede incluir: dolor torácico, latidos cardíacos irregulares, dificultad para respirar o hinchazón de los tobillos; confusión, somnolencia, problemas de memoria, cambios en el estado de ánimo o el comportamiento, rigidez en la nuca, problemas de equilibrio; hormigueo, entumecimiento o debilidad de brazos o piernas; visión doble, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor ocular; cambios en la vista; dolor o debilidad muscular persistente o grave, calambres musculares, dolor articular, rigidez o hinchazón articular; bajo nivel de glóbulos rojos y hematomas



Reacciones a la infusión que pueden llegar a ser graves o potencialmente mortales. Los signos y síntomas de reacciones a la infusión pueden incluir: escalofríos o temblores, comezón o erupción cutánea, enrojecimiento (*flushing*), dificultad para respirar o sibilancia, mareos, sensación de desmayo, fiebre y dolor de espalda o cuello



Complicaciones, incluida la enfermedad de injerto contra huésped (EICH), en personas que han recibido un trasplante de médula ósea (células madre) que utiliza células madre donadas (alogénico). Estas complicaciones pueden ser graves y provocar la muerte, y pueden ocurrir si se ha sometido a un trasplante antes o después de recibir el tratamiento con IMFINZI. Su proveedor de atención médica le vigilará para detectar estas complicaciones

Para obtener Información Importante de Seguridad adicional, consulte las páginas 18 a 19.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA (continuación)

Recibir tratamiento médico de inmediato puede evitar que estos trastornos se agraven. Su proveedor de atención médica le realizará exámenes para detectar estos problemas durante el tratamiento con IMFINZI e IMJUDO y le administrará corticosteroides o medicinas de reemplazo hormonal en caso necesario. Si presenta efectos secundarios graves, puede que su proveedor de atención médica deba también retrasar o interrumpir por completo el tratamiento con IMFINZI e IMJUDO.

Antes de recibir IMFINZI e IMJUDO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si:

- tiene algún trastorno del sistema inmunitario, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o el lupus
- ha recibido un trasplante de órgano
- ha recibido o planea recibir un trasplante de células madre donadas (allogénico)
- ha recibido radioterapia en el área del pecho
- tiene una afección del sistema nervioso, como la miastenia grave o el síndrome de Guillain-Barré
- está embarazada o planea quedar embarazada. IMFINZI e IMJUDO pueden dañar al bebé en gestación

Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- Su proveedor de atención médica le hará una prueba de embarazo antes de empezar el tratamiento con IMFINZI e IMJUDO.
- Debe usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y 3 meses después de la última dosis de IMFINZI e IMJUDO. Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que puede usar durante este periodo.
- Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o cree que podría estarlo durante el tratamiento con IMFINZI e IMJUDO.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si IMFINZI e IMJUDO pasan a la leche materna. No debe amamantar durante el tratamiento y hasta 3 meses después de la última dosis de IMFINZI e IMJUDO.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con o sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE IMFINZI E IMJUDO?

IMFINZI e IMJUDO pueden causar efectos secundarios graves (ver páginas 16-17):

Los efectos secundarios más comunes de IMFINZI e IMJUDO en adultos con CHCi incluyen erupción cutánea, diarrea, sensación de cansancio, comezón, dolor muscular u óseo y dolor de estómago (abdominal).

Informe a su proveedor de atención médica si experimenta algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de IMFINZI e IMJUDO. Solicite más información a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Puede [informar sobre los efectos secundarios de los productos de AstraZeneca](#). Si prefiere reportarlos a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), visite www.FDA.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

¿QUÉ SON IMFINZI E IMJUDO?

IMFINZI es un medicamento con receta que se utiliza en combinación con IMJUDO para tratar a adultos con **un tipo de cáncer de hígado que no se puede extirpar mediante cirugía (carcinoma hepatocelular irreseccable o CHCi).**

Se desconoce si IMFINZI e IMJUDO son seguros y eficaces en niños.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional junto con la Información de Prescripción Completa y la Guía del Medicamento haga clic aquí para obtener más información acerca de IMFINZI e IMJUDO.



I'M IN -

Dispuesto a seguir luchando

VISITE [IMFINZI.COM/uHCC](https://www.imfinzi.com/uHCC) (disponible solo en inglés) PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

O llame a AstraZeneca al **1-800-236-9933**

de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., hora del Este, excepto días festivos



IMFINZI e IMJUDO son marcas comerciales registradas, y AstraZeneca Access 360 es una marca comercial del grupo de empresas AstraZeneca.
© 2025 AstraZeneca. Todos los derechos reservados.
US-97220 Última actualización 5/25

